
# MR SPRING NOBLE 2-ETN
NAZWA

| 840M003123606835 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3123606835** | **2017-03-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **865** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **171** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1195** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1166** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1146** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1096** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1917** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **907** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.4** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.2** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **633** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **92** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **128** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **128** | 0.69 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 114 | 57 |
| wymię | MACE | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 114 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 114 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.86 | 114 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.70 | 114 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.71 | 114 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 114 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.81 | 114 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 114 | 57 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 114 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 114 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.75 | 114 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **126** | niskie | | wysokie | 0.59 | 114 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.71 | 114 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **128** | niskie | | wysokie | 0.84 | 114 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 114 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.79 | 114 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 114 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 114 | 57 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.74 | 114 | 57 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.51 | 114 | 57 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.46 | 78 | 36 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.36 | 77 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.50 | 285 | 37 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.53 | 170 | 15 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.45 | 247 | 35 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.58 | 160 | 13 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |