
# SEAGULL-BAY COLONIAL-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003124720363**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3124720363**<br>NUMER | **2014-09-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **815** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **125** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1186** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1020** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1157** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **830** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-137** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **27.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.37** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.5** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **451** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **137** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.38 | 62 | 21 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | | | pożądane | 0.59 | 62 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | **108** | niepożądana | | | | pożądana | 0.59 | 62 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | | | wysoki | 0.80 | 62 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | **83** | płytki | | | | głęboki | 0.70 | 62 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | | | szeroka | 0.63 | 62 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.73 | 62 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | 62 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | | | podsiebna | 0.61 | 62 | 21 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.52 | 62 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | | | równolegle | 0.37 | 62 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **136** | luźne | | | | mocne | 0.68 | 62 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | | | wysokie | 0.62 | 62 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | | | mocne | 0.52 | 62 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | **129** | niskie | | | | wysokie | 0.76 | 62 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | | | wąskie | 0.77 | 62 | 21 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | | | długie | 0.79 | 62 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.73 | 62 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.49 | 62 | 21 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | | | mocna | 0.68 | 62 | 21 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | | | dobra | 0.34 | 62 | 21 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | | | 0.32 | 62 | 21 |
| temperament | MACE | **107** | | | | | | 0.18 | 62 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | | | 0.40 | 365 | 66 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | | | 0.29 | 72 | 17 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | | | 0.34 | 204 | 46 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |