
# DE-SU AINSLEY ACE 13663-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003134408272**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3134408272**<br>NUMER | **2016-07-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **824** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **67** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1173** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1128** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1177** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1084** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **859** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-22** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.8** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.7** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **201** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **116** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **123** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **124** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **126** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.40 | 107 | 76 |
| wymię | MACE | **130** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.56 | 107 | 76 |
| budowa ogólna | MACE | **120** | niepożądana | | | | pożądana | 0.50 | 107 | 76 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | | | wysoki | 0.85 | 107 | 76 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | | | głęboki | 0.67 | 107 | 76 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | | | szeroka | 0.68 | 107 | 76 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | 107 | 76 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | | | szeroki | 0.80 | 107 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | 107 | 76 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.54 | 107 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **77** | iksowate | < | | | równolegle | 0.61 | 107 | 76 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **136** | luźne | | | > | mocne | 0.72 | 107 | 76 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | | | > | wysokie | 0.53 | 107 | 76 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | | | mocne | 0.68 | 107 | 76 |
| położenie wymienia | MACE | **138** | niskie | | | > | wysokie | 0.84 | 107 | 76 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | | | wąskie | 0.83 | 107 | 76 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | | | długie | 0.77 | 107 | 76 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.82 | 107 | 76 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.49 | 107 | 76 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | | | mocna | 0.72 | 107 | 76 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | | | dobra | 0.42 | 107 | 76 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.31 | 94 | 65 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.17 | 93 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.42 | 553 | 164 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **116** | | | | 0.47 | 74 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.35 | 553 | 164 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.52 | 74 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |