
| WHINO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **840M003141562683**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3141562683**<br>NUMER | **2017-01-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **818** | 0.82 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-99** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1353** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1212** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.80 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1394** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-174** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.4** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-8.7** | 0.90 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.90 |
| LICZBA CÓREK | **75** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **34** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **126** | 0.59 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **127** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **118** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **136** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **144** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **92** | mały | | duży | 0.45 | 6 | 4 |
| siła mleczności | F | **93** | niepożądany | | pożądany | 0.48 | 6 | 4 |
| nogi-racice | FI | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.72 | 6 | 4 |
| wymię | FI | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 6 | 4 |
| budowa ogólna | FI | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.70 | 6 | 4 |
| wysokość w krzyżu | FI | **86** | niski | | wysoki | 0.91 | 6 | 4 |
| głębokość tułowia | FI | **84** | płytki | | głęboki | 0.79 | 6 | 4 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **112** | wąska | | szeroka | 0.84 | 6 | 4 |
| ustawienie zadu | FI | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 6 | 4 |
| szerokość zadu | FI | **90** | wąski | | szeroki | 0.86 | 6 | 4 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 6 | 4 |
| racice | FI | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | 6 | 4 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **113** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 6 | 4 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **124** | luźne | | mocne | 0.84 | 6 | 4 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **110** | niskie | | wysokie | 0.80 | 6 | 4 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **111** | słabe | | mocne | 0.78 | 6 | 4 |
| położenie wymienia | FI | **121** | niskie | | wysokie | 0.91 | 6 | 4 |
| szerokość wymienia | F | **103** | wąskie | | szerokie | 0.60 | 6 | 4 |
| ustawienie strzyków | FI | **100** | szerokie | | wąskie | 0.94 | 6 | 4 |
| długość strzyków | FI | **82** | krótkie | | długie | 0.96 | 6 | 4 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **119** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 6 | 4 |
| charakter mleczny | F | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.78 | 6 | 4 |
| kondycja | FI | **130** | słaba | | mocna | 0.88 | 6 | 4 |
| lokomocja | FI | **110** | słaba | | dobra | 0.70 | 3 | 2 |
| struktura kostna | F | **106** | słaba | | dobra | 0.51 | 6 | 4 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **90** | | | | 0.70 | 59 | 24 |
| temperament | F | **83** | | | | 0.57 | 40 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **100** | | | | 0.48 | 4 | 4 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **99** | | | | 0.60 | 29 | 14 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **116** | | | | 0.45 | 13 | 9 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **109** | | | | 0.70 | 30 | 15 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **103** | | | | 0.29 | 3 | 2 |