
# BLUMENFELD BOURBON SAID-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003141657461**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3141657461**<br>NUMER | **2017-02-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **841** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **326** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1057** | 0.77 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1021** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1117** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1530** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1283** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **28.6** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **35.4** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1918** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **330** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | 114 | 40 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | | | pożądane | 0.61 | 114 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **124** | niepożądana | | | | pożądana | 0.62 | 110 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | | | wysoki | 0.84 | 114 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | | | głęboki | 0.73 | 114 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | | | szeroka | 0.75 | 114 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | 114 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | | | szeroki | 0.78 | 114 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | 114 | 40 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.64 | 114 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.62 | 114 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **119** | luźne | | | | mocne | 0.72 | 114 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | 114 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | | | mocne | 0.66 | 114 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | 114 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | | | wąskie | 0.83 | 114 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | | | długie | 0.82 | 114 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.80 | 114 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.56 | 114 | 40 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | | | mocna | 0.70 | 114 | 40 |
| lokomocja | MACE | **114** | słaba | | | | dobra | 0.53 | 114 | 40 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | | | 0.39 | 65 | 18 |
| temperament | MACE | **89** | | | | | | 0.29 | 64 | 17 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | | | 0.47 | 2706 | 218 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | | | 0.57 | 756 | 146 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | | | 0.45 | 2683 | 207 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.64 | 734 | 136 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |