| TODOLIST | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **840M003250026188**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3250026188**<br>NUMER | **2022-11-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1034** | 0.82 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **670** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1234** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1214** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1162** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1069** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3324** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **834** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **96.3** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **0.64** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **47.4** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **35.6** | 0.85 |
| % LAKTOZY | **-0.05** | 0.85 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **136** | 0.70 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **126** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **117** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **117** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **117** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **133** | 0.81 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDC | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **106** | mały | | duży | 0.78 | - | - |
| siła mleczności | G | **105** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | - | - |
| nogi-racice | G | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| wymię | G | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | - | - |
| budowa ogólna | G | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **105** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **85** | płytki | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **91** | wąska | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | G | **106** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | G | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **113** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **112** | luźne | | mocne | 0.85 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **120** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **97** | słabe | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | G | **119** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **107** | wąskie | | szerokie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **113** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | G | **95** | krótkie | | długie | 0.87 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | G | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | G | **92** | słaba | | mocna | 0.86 | - | - |
| lokomocja | G | **122** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **119** | gruba | | płaska | 0.81 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **118** | | | | 0.73 | - | - |
| temperament | G | **63** | | | | 0.64 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **106** | | | | 0.75 | 3 | 2 |
| przebieg porodu matczyny | G | **119** | | | | 0.78 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **100** | | | | 0.73 | 7 | 4 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 124 | | > | | 0.82 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 112 | | | | 0.61 | - | - |