
# KENRON TO-JO
NAZWA

| AUSM000A00006814 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **AU000A00006814** | **1990-08-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **568** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-283** | 0.52 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **885** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **995** | 0.33 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **903** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **969** | 0.33 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1457** | 0.51 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-573** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.5** | 0.56 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.8** | 0.50 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **75** | 0.63 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.33 | 20 | 17 |
| wymię | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 20 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **64** | niepożądana | | pożądana | 0.40 | 20 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **57** | niski | | wysoki | 0.64 | 20 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.50 | 20 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.44 | 20 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **81** | uniesiony | | spadzisty | 0.58 | 20 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **67** | wąski | | szeroki | 0.54 | 20 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.48 | 20 | 17 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 20 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.36 | 20 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.48 | 20 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.47 | 20 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.49 | 20 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.61 | 20 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 20 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.63 | 20 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 20 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.40 | 20 | 17 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.27 | 23 | 15 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.11 | 23 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.26 | 51 | 23 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.21 | 51 | 23 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |