
# WONGALEA MR BELLWOOD

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00009539**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00009539**<br>NUMER | **1995-06-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **638** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-64** | 0.54 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **924** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **932** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.51 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-526** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **350** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.8** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.52 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **155** | 0.65 |
| LICZBA OBÓR | **94** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.60 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 40 | 20 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 40 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.44 | 40 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.68 | 40 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.55 | 40 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.47 | 40 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 40 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.59 | 40 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.52 | 40 | 20 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 40 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 40 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.52 | 40 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.52 | 40 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.54 | 40 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.67 | 40 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 40 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.69 | 40 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 40 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 40 | 20 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.41 | 97 | 55 |
| temperament | MACE | **111** | | | | 0.30 | 97 | 55 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.37 | 106 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.31 | 106 | 52 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.38 | 38 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |