
# GLYNYARI VOODOO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000H00925929**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000H00925929**<br>NUMER | **1998-08-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-16** | 0.58 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **938** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **988** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **927** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-544** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-434** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.4** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.3** | 0.54 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.54 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1630** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **348** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 204 | 72 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 204 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 204 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.74 | 204 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.60 | 204 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.49 | 204 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 204 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.67 | 204 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 204 | 72 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 204 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 204 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.57 | 204 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.54 | 204 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.58 | 204 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.79 | 204 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 204 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.82 | 204 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 204 | 72 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 204 | 72 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.31 | 596 | 174 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.12 | 596 | 174 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.33 | 1302 | 166 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.22 | 1302 | 166 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.54 | 602 | 185 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |