
# ECLIPSE WORRIER
NAZWA

| AUSM000H01198637 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **AU000H01198637** | **2002-09-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **631** | 0.40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **35** | 0.49 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **817** | 0.42 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.24 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **876** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **942** | 0.29 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1084** | 0.49 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-662** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **13.9** | 0.54 |
| % TŁUSZCZU | **0.48** | 0.54 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.5** | 0.46 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.46 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.62 |
| LICZBA OBÓR | **36** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.35 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.42 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **64** | niepożądane | | pożądane | 0.27 | 37 | 18 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 37 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.35 | 37 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.67 | 37 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.51 | 37 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.41 | 37 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **81** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 37 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.57 | 37 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.49 | 37 | 18 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 37 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **65** | iksowate | | równolegle | 0.30 | 37 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.48 | 37 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.47 | 37 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.50 | 37 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.66 | 37 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 37 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.68 | 37 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 37 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.37 | 37 | 18 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.29 | 59 | 30 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.10 | 59 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **59** | | | | 0.24 | 60 | 12 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | | | | 0.14 | 60 | 12 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |