
# BONACCUEIL CHUCKY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006277845**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6277845**<br>NUMER | **1994-08-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **605** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-103** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **824** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1461** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-584** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.5** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.6** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 83 | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | 85 | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | - | - |
| budowa ogólna | I | 89 | niepożądana | | | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 105 | niski | | | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | I | 120 | płytki | | | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | 110 | wąska | | | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | 93 | uniesiony | | | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | 112 | wąski | | | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 116 | pionowa | | | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | 80 | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.55 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | 70 | iksowate | < | | | równolegle | 0.56 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | 86 | luźne | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | 84 | niskie | | | | wysokie | 0.58 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 102 | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | 77 | niskie | < | | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 92 | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | I | 99 | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | 98 | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | I | 112 | ordynarny | | | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | 77 | słaba | < | | | dobra | 0.51 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 98 | | | | 0.32 | 68 | 64 |
| temperament | MACE | 106 | | | | 0.16 | 55 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 95 | | | | 0.36 | 193 | 175 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 89 | | | | 0.27 | 193 | 175 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |