
# NEWLANDS NOBLE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006772059**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6772059**<br>NUMER | **1996-11-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-187** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **902** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **953** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **904** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1162** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-102** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-44.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.45** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.5** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 80 | 57 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 80 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 80 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.83 | 80 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.66 | 80 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.66 | 80 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 80 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.78 | 80 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 80 | 57 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 80 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 80 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.71 | 80 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.55 | 80 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.67 | 80 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.82 | 80 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 80 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.75 | 80 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 80 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 80 | 57 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.43 | 80 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.35 | 50 | 37 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.23 | 50 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.37 | 139 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.48 | 62 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.28 | 139 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.51 | 60 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |