
# LYSTEL COLORADO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006779431**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6779431**<br>NUMER | **1997-05-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-310** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **995** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **971** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-965** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-14** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.2** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.42** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.2** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.28** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **477** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **224** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 328 | 160 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 328 | 160 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 327 | 159 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.89 | 328 | 160 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.80 | 328 | 160 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.81 | 328 | 160 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 328 | 160 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.85 | 328 | 160 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 328 | 160 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 328 | 160 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 328 | 160 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.78 | 328 | 160 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.72 | 328 | 160 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.78 | 328 | 160 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.88 | 328 | 160 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 328 | 160 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.88 | 328 | 160 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 314 | 151 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 328 | 160 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.64 | 46 | 28 |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.56 | 305 | 154 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **115** | | | | 0.40 | 130 | 73 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.26 | 129 | 72 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.45 | 342 | 140 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.55 | 102 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.38 | 271 | 123 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.60 | 94 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |