# BENNER BROOK
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006793825**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6793825**<br>NUMER | **1997-02-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **556** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-235** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **806** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **952** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **863** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1051** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1840** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-605** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.1** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **60** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 39 | 24 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 39 | 24 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 39 | 24 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.76 | 39 | 24 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.64 | 39 | 24 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.67 | 39 | 24 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 39 | 24 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.65 | 39 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 39 | 24 |
| racice | MACE | **65** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 39 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **71** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 39 | 24 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.64 | 39 | 24 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.62 | 39 | 24 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.56 | 39 | 24 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.74 | 39 | 24 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 39 | 24 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.73 | 39 | 24 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 39 | 24 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.57 | 39 | 24 |
| lokomocja | MACE | **65** | słaba | | dobra | 0.49 | 39 | 24 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.37 | 73 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |