
# CBS SURVIVOR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000007174422**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CA7174422**<br>NUMER | **2001-06-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **609** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-185** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **935** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **988** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-855** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-229** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.5** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **102** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 73 | 69 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 73 | 69 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 73 | 69 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.83 | 73 | 69 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.65 | 73 | 69 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.66 | 73 | 69 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 73 | 69 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.76 | 73 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 73 | 69 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 73 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 73 | 69 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.68 | 73 | 69 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.58 | 73 | 69 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.70 | 73 | 69 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.82 | 73 | 69 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 73 | 69 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.86 | 73 | 69 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.61 | 73 | 69 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.29 | 71 | 67 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | < | | | 0.51 | 81 | 77 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.54 | 84 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |