
| BROCK-RED | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000007355178** NUMER MIĘDZ. | **RW** RASA |
| **CA7355178** NUMER | **2003-08-22** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-149** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **945** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **923** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1061** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **963** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-819** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-640** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.2** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-7.5** | 0.33 |
| % LAKTOZY | **0.28** | 0.33 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **110** | niski | | wysoki | 0.76 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **100** | płytki | | głęboki | 0.65 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **103** | wąska | | szeroka | 0.67 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **124** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | szeroki | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | - | - |
| racice | I | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **110** | iksowate | | równolegle | 0.51 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **102** | luźne | | mocne | 0.70 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **103** | niskie | | wysokie | 0.59 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **97** | słabe | | mocne | 0.62 | - | - |
| położenie wymienia | I | **102** | niskie | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **91** | szerokie | | wąskie | 0.78 | - | - |
| długość strzyków | I | **109** | krótkie | | długie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **105** | słaba | | mocna | 0.74 | - | - |
| lokomocja | I | **106** | słaba | | dobra | 0.50 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **88** | | | | 0.27 | 1 | 1 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.25 | 50 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **87** | | | | 0.40 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **93** | | | | 0.48 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **59** | | | | 0.37 | 159 | 99 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 102 | | | | 0.47 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |