
# ALTA KEYSTONE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000007533516**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA7533516**<br>NUMER | **2004-10-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **882** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **810** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1044** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **994** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **21** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **638** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.19** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **61** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 110 | 57 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 110 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 110 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.82 | 110 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.67 | 110 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.73 | 110 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 110 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.71 | 110 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 110 | 57 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 110 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 110 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.70 | 110 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.68 | 110 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.59 | 110 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.82 | 110 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 110 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.82 | 110 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 110 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 110 | 57 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.61 | 110 | 57 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.54 | 110 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.36 | 193 | 55 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.45 | 118 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.34 | 182 | 51 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 77 | < | | | 0.51 | 105 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |