
# ALTADELWYN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000007890299**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA7890299**<br>NUMER | **2006-08-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **737** | 0.79 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-42** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **992** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1109** | 0.73 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1137** | 0.78 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1093** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **198** | 0.84 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **8** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.1** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.78 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | - | - |
| wymię | I | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | - | - |
| budowa ogólna | I | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **114** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **95** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | szeroka | 0.83 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | - | - |
| szerokość zadu | I | **105** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | I | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.73 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **118** | iksowate | | równolegle | 0.72 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **105** | luźne | | mocne | 0.84 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **110** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **114** | słabe | | mocne | 0.81 | - | - |
| położenie wymienia | I | **113** | niskie | | wysokie | 0.90 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.95 | - | - |
| długość strzyków | I | **124** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | I | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.79 | - | - |
| kondycja | I | **91** | słaba | | mocna | 0.88 | - | - |
| lokomocja | I | **122** | słaba | | dobra | 0.64 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.46 | 411 | 149 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.33 | 400 | 144 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **98** | | | | 0.56 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **108** | | | | 0.68 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | 0.55 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 119 | | | | 0.73 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |