
# WEST PORT GOLDWYN BADGER

NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000008930021**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA8930021**<br>NUMER | **2006-09-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-147** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **830** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1021** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1090** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1463** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1435** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4.7** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.69** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.3** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.35** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **367** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **224** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **67** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 199 | 135 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 199 | 135 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 199 | 135 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.88 | 199 | 135 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.72 | 199 | 135 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.74 | 199 | 135 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 199 | 135 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.84 | 199 | 135 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 199 | 135 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 199 | 135 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 199 | 135 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.78 | 199 | 135 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.61 | 199 | 135 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.75 | 199 | 135 |
| położenie wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.87 | 199 | 135 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 199 | 135 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.81 | 199 | 135 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 199 | 135 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 199 | 135 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.78 | 199 | 135 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.53 | 199 | 135 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.46 | 204 | 141 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.35 | 204 | 141 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.51 | 926 | 222 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.59 | 153 | 99 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.49 | 920 | 220 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.67 | 186 | 114 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |