
# GENERVATIONS EMILIO
NAZWA

| CANM000010963292 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA10963292** | **2010-03-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **676** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-126** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1025** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1111** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-527** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-362** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 28 | 17 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 28 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 28 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.74 | 28 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.63 | 28 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.65 | 28 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **123** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 28 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.64 | 28 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 28 | 17 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 28 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 28 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.62 | 28 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.60 | 28 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.55 | 28 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **118** | niskie | | wysokie | 0.71 | 28 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 28 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.70 | 28 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 28 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 28 | 17 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.59 | 28 | 17 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.50 | 28 | 17 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.46 | 211 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.49 | 76 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.43 | 187 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 65 | < | | | 0.53 | 74 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |