
# SARTIGAN RIKLER
NAZWA

| CANM000102737750 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA102737750** | **2005-01-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **25** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **883** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **783** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1022** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-558** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-80** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **71** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 69 | 65 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 69 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 69 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.82 | 69 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.64 | 69 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.63 | 69 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 69 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.76 | 69 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 69 | 65 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 69 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **73** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 69 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.68 | 69 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.51 | 69 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.63 | 69 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.80 | 69 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 69 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.73 | 69 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 69 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 69 | 65 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.67 | 69 | 65 |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.41 | 69 | 65 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.34 | 64 | 60 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.23 | 64 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.40 | 288 | 251 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | 0.47 | 61 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.32 | 288 | 251 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.51 | 61 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |