
# MEGAWATT
NAZWA

| CANM000108657338 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA108657338** | **2013-11-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **797** | 0.80 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **79** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1011** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1182** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1190** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **132** | 0.84 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **36** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.1** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.58 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **125** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.81 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **117** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **126** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.66 | - | - |
| wymię | I | **121** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.77 | - | - |
| budowa ogólna | I | **123** | niepożądana | | | > | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **124** | niski | | | > | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **97** | płytki | | | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **102** | wąska | | | | szeroka | 0.89 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **96** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.91 | - | - |
| szerokość zadu | I | **100** | wąski | | | | szeroki | 0.91 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **88** | pionowa | | | | podsiebna | 0.91 | - | - |
| racice | I | **121** | długa przekątna | | | > | krótka przekątna | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **117** | iksowate | | | | równolegle | 0.79 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **114** | luźne | | | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **127** | niskie | | | > | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **121** | słabe | | | > | mocne | 0.86 | - | - |
| położenie wymienia | I | **123** | niskie | | | > | wysokie | 0.93 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **127** | szerokie | | | > | wąskie | 0.96 | - | - |
| długość strzyków | I | **103** | krótkie | | | | długie | 0.96 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **127** | zewnętrzne | | | > | wewnętrzne | 0.94 | - | - |
| charakter mleczny | I | **113** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.84 | - | - |
| kondycja | I | **96** | słaba | | | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | I | **127** | słaba | | | > | dobra | 0.68 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.43 | 1978 | 1069 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.23 | 1824 | 1020 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **98** | | | | 0.54 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **107** | | | | 0.73 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **98** | | | | 0.58 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 105 | | | | 0.78 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |