
# BLONDIN AMNISTY PP
NAZWA

| CANM000120781912 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA120781912** | **2021-11-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **819** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **166** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1055** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1003** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1291** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1110** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1155** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **632** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **29** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.4** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **45.9** | 0.74 |
| % LAKTOZY | **0.16** | 0.74 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.79 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB | LGBF |
| MFF | POF | POS | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **127** | mały | > | duży | 0.63 | - | - |
| siła mleczności | G | **134** | niepożądany | > | pożądany | 0.65 | - | - |
| nogi-racice | G | **138** | niepożądane | > | pożądane | 0.68 | - | - |
| wymię | G | **137** | niepożądane | > | pożądane | 0.71 | - | - |
| budowa ogólna | G | **143** | niepożądana | > | pożądana | 0.72 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **135** | niski | > | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **129** | płytki | > | głęboki | 0.76 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **103** | wąska | | szeroka | 0.77 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | G | **121** | wąski | > | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GMACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | - | - |
| racice | G | **124** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GMACE | **126** | iksowate | > | równolegle | 0.76 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **128** | luźne | > | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **144** | niskie | > | wysokie | 0.75 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **125** | słabe | > | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | G | **124** | niskie | > | wysokie | 0.79 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **137** | wąskie | > | szerokie | 0.69 | - | - |
| ustawienie strzyków | GMACE | **118** | szerokie | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | G | **105** | krótkie | | długie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **121** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | G | **137** | ordynarny | > | szlachetny | 0.77 | - | - |
| kondycja | G | **74** | słaba | < | mocna | 0.78 | - | - |
| lokomocja | G | **141** | słaba | > | dobra | 0.70 | - | - |
| struktura kostna | G | **121** | słaba | > | dobra | 0.69 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **104** | | | | 0.55 | - | - |
| temperament | G | **107** | | | | 0.44 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **107** | | | | 0.62 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **95** | | | | 0.66 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **98** | | | | 0.60 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **103** | | | | 0.70 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **104** | | | | 0.40 | - | - |