
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120008369595**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **CH120008369595**<br>NUMER | **2000-08-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-267** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1074** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1130** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **893** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **977** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-892** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-999** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.5** | 0.62 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.8** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.18 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **118** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 86 | 77 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 86 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 86 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.84 | 86 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.66 | 86 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.67 | 86 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 86 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.76 | 86 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 86 | 77 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 86 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 86 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.69 | 86 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.59 | 86 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **65** | słabe | | mocne | 0.72 | 86 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.83 | 86 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 86 | 77 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | | długie | 0.87 | 86 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **122** | słaba | | mocna | 0.63 | 86 | 77 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.27 | 85 | 76 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **114** | | | | 0.50 | 75 | 68 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.54 | 76 | 69 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |