
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM310019911030**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CH310019911030**<br>NUMER | **1998-02-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-267** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **936** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1132** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **912** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1535** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1155** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.2** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **389** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **309** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **132** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 280 | 228 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 280 | 228 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 280 | 228 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.87 | 280 | 228 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.71 | 280 | 228 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.74 | 280 | 228 |
| ustawienie zadu | MACE | **118** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 280 | 228 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.80 | 280 | 228 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 280 | 228 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 280 | 228 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 280 | 228 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.75 | 280 | 228 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.64 | 280 | 228 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.79 | 280 | 228 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.88 | 280 | 228 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 280 | 228 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.92 | 280 | 228 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 235 | 190 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 235 | 190 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.71 | 280 | 228 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.39 | 176 | 146 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.37 | 276 | 224 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.18 | 234 | 189 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.40 | 108 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.63 | 223 | 180 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.31 | 119 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.64 | 244 | 199 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |