| RUMPIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000113657906**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0113657906**<br>NUMER | **2001-11-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **577** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-253** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **889** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **977** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **965** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1777** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1194** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.8** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.47** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-35** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **36** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **30** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.42 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 27 | 22 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 27 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 27 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.69 | 27 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.58 | 27 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.56 | 27 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 27 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **73** | wąski | | szeroki | 0.62 | 27 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **63** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 27 | 22 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 27 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 27 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.61 | 27 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.52 | 27 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.55 | 27 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.66 | 27 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **73** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 27 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.68 | 27 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 27 | 22 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.58 | 27 | 22 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.33 | 25 | 21 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.31 | 14 | 12 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.11 | 24 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.29 | 100 | 61 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **68** | | | | 0.42 | 30 | 23 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.27 | 100 | 61 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |