
| MEDIKUS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000117087394**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0117087394**<br>NUMER | **2010-05-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **629** | 0.43 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-177** | 0.61 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **945** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **929** | 0.31 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1030** | 0.31 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1052** | 0.29 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1096** | 0.53 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-189** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.5** | 0.59 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-15.4** | 0.62 |
| % LAKTOZY | **-0.07** | 0.62 |
| LICZBA CÓREK | **11** | 0.62 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.35 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.31 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.60 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.42 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **114** | mały | | duży | 0.31 | 2 | 1 |
| siła mleczności | F | **110** | niepożądany | | pożądany | 0.32 | 2 | 1 |
| nogi-racice | F | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.28 | 2 | 1 |
| wymię | F | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.29 | 2 | 1 |
| budowa ogólna | F | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.30 | 2 | 1 |
| wysokość w krzyżu | F | **107** | niski | | wysoki | 0.37 | 2 | 1 |
| głębokość tułowia | F | **94** | płytki | | głęboki | 0.33 | 2 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **95** | wąska | | szeroka | 0.33 | 2 | 1 |
| ustawienie zadu | F | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.36 | 2 | 1 |
| szerokość zadu | F | **111** | wąski | | szeroki | 0.34 | 2 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.29 | 2 | 1 |
| racice | F | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.28 | 2 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **82** | iksowate | | równolegle | 0.28 | 2 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **93** | luźne | | mocne | 0.33 | 2 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **104** | niskie | | wysokie | 0.33 | 2 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **111** | słabe | | mocne | 0.31 | 2 | 1 |
| położenie wymienia | F | **104** | niskie | | wysokie | 0.36 | 2 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **98** | wąskie | | szerokie | 0.31 | 2 | 1 |
| ustawienie strzyków | F | **104** | szerokie | | wąskie | 0.34 | 2 | 1 |
| długość strzyków | F | **97** | krótkie | | długie | 0.36 | 2 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.34 | 2 | 1 |
| charakter mleczny | F | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.36 | 2 | 1 |
| kondycja | F | **92** | słaba | | mocna | 0.35 | 2 | 1 |
| lokomocja | F | **91** | słaba | | dobra | 0.27 | 1 | 1 |
| struktura kostna | F | **101** | gruba | | płaska | 0.31 | 2 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **119** | | | | 0.30 | 3 | 2 |
| temperament | F | **99** | | | | 0.26 | 2 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |