
| CASO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000342799511**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0342799511**<br>NUMER | **1997-09-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-89** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **885** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **892** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **876** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1030** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1238** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-638** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.38** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.4** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **65** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 60 | 30 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 60 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 60 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.82 | 60 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.72 | 60 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.70 | 60 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 60 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.75 | 60 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 60 | 30 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 60 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.74 | 60 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.64 | 60 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.70 | 60 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.79 | 60 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 60 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **130** | krótkie | | długie | 0.82 | 60 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **80** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 60 | 30 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.43 | 188 | 41 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.56 | 68 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.43 | 188 | 41 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.57 | 68 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |