
| LEO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000345416661**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0345416661**<br>NUMER | **2000-08-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-215** | 0.58 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1050** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1027** | 0.27 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **881** | 0.25 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **964** | 0.25 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-595** | 0.50 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-720** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.9** | 0.60 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.8** | 0.56 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-30.2** | 0.59 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.59 |
| LICZBA CÓREK | **9** | 0.59 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.27 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.30 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.28 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.42 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | - | - | niski | | wysoki | | - | - |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | - | - | uniesiony | | spadzisty | | - | - |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | - | - | pionowa | | podsiebna | | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | - | - | słabe | | mocne | | - | - |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | - | - | szerokie | | wąskie | | - | - |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **97** | | | | 0.26 | 1 | 1 |
| temperament | F | **87** | | | | 0.22 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |