# MAURIN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000347383849**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0347383849**<br>NUMER | **2001-07-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **545** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-159** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **724** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **941** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **982** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1951** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-286** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.9** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **76** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **65** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 55 | 52 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 55 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 55 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.78 | 55 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.68 | 55 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.65 | 55 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 55 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.71 | 55 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 55 | 52 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 55 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **61** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 55 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.70 | 55 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.60 | 55 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.65 | 55 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.76 | 55 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 55 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.78 | 55 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 55 | 52 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.68 | 55 | 52 |
| lokomocja | MACE | **75** | słaba | | dobra | 0.45 | 41 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.39 | 26 | 26 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.29 | 47 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.42 | 190 | 107 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **70** | | | | 0.52 | 54 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.41 | 190 | 107 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 90 | | | | 0.53 | 54 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |