| TRELION | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000349953922**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0349953922**<br>NUMER | **2005-01-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **571** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-173** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **749** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **860** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1078** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1017** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1834** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-80** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-34.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.6** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **65** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 46 | 40 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 46 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 46 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.77 | 46 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.67 | 46 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.65 | 46 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 46 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.70 | 46 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 46 | 40 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 46 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 46 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.70 | 46 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.60 | 46 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.64 | 46 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.75 | 46 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 46 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.77 | 46 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 46 | 40 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.67 | 46 | 40 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.44 | 42 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.28 | 42 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.39 | 202 | 173 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.52 | 60 | 55 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.38 | 202 | 173 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.54 | 60 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |