
| BELMARO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000357419805**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0357419805**<br>NUMER | **2014-10-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **837** | 0.89 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **303** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1100** | 0.89 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.86 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1174** | 0.90 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.84 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1515** | 0.92 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **330** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.6** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **40** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **0.31** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **3.6** | 0.87 |
| % LAKTOZY | **-0.13** | 0.87 |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.79 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.84 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.89 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.88 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **110** | mały | | duży | 0.80 | - | - |
| siła mleczności | G | **111** | niepożądany | | pożądany | 0.81 | - | - |
| nogi-racice | GI | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.84 | - | - |
| wymię | GI | **126** | niepożądane | | pożądane | 0.87 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **121** | niepożądana | | pożądana | 0.87 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **103** | niski | | wysoki | 0.94 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **103** | płytki | | głęboki | 0.91 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **118** | wąska | | szeroka | 0.92 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **83** | uniesiony | | spadzisty | 0.93 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **106** | wąski | | szeroki | 0.92 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.92 | - | - |
| racice | GI | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.87 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **107** | iksowate | | równolegle | 0.86 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **114** | luźne | | mocne | 0.92 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **118** | niskie | | wysokie | 0.90 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **112** | słabe | | mocne | 0.91 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **117** | niskie | | wysokie | 0.94 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **105** | wąskie | | szerokie | 0.85 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **105** | szerokie | | wąskie | 0.95 | - | - |
| długość strzyków | GI | **106** | krótkie | | długie | 0.96 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.94 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.91 | - | - |
| kondycja | GI | **104** | słaba | | mocna | 0.93 | - | - |
| lokomocja | GI | **127** | słaba | | dobra | 0.85 | - | - |
| struktura kostna | G | **110** | słaba | | dobra | 0.83 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **89** | | | | 0.73 | - | - |
| temperament | G | **92** | | | | 0.64 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **121** | | | | 0.80 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **111** | | | | 0.86 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **91** | | | | 0.80 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **99** | | | | 0.87 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **103** | | | | 0.62 | - | - |