
# COLUMBIA
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000532490050**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0532490050**<br>NUMER | **1997-07-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **585** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-158** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **788** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **983** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **915** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1921** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-706** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.8** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.2** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | | | pożądane | 0.51 | - | - |
| wymię | I | **78** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **78** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **91** | niski | | | | wysoki | 0.77 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **100** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **94** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **94** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.73 | - | - |
| szerokość zadu | I | **91** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **99** | pionowa | | | | podsiebna | 0.69 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **107** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **78** | luźne | < | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.61 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **104** | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **78** | niskie | < | | | wysokie | 0.76 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **69** | szerokie | < | | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | I | **145** | krótkie | | | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **89** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.74 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.32 | 24 | 22 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.18 | 27 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **91** | | | | 0.35 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **100** | | | | 0.55 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **99** | | | | 0.33 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 100 | | | | 0.54 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |