| MEROLD | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000533067770** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0533067770** NUMER | **1999-04-05** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **534** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-262** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **720** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **996** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **857** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-3142** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-968** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **48** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 63 | 31 |
| wymię | MACE | **57** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 63 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 63 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.81 | 63 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **133** | płytki | | głęboki | 0.70 | 63 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **132** | wąska | | szeroka | 0.68 | 63 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 63 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.74 | 63 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 63 | 31 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 63 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **68** | luźne | | mocne | 0.73 | 63 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **59** | niskie | | wysokie | 0.61 | 63 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.68 | 63 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **58** | niskie | | wysokie | 0.79 | 63 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 63 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.82 | 63 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 63 | 31 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.36 | 212 | 41 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.53 | 86 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.34 | 212 | 41 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.54 | 86 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |