
| KNS |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000538319826 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0538319826** | **2014-04-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **752** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **19** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1130** | 0.77 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **923** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1147** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **845** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **360** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.2** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **360** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | - | - |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 170 | 36 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 170 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.45 | 170 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.86 | 170 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.74 | 170 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.60 | 170 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 170 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.79 | 170 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 170 | 36 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 170 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 170 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **116** | luźne | | mocne | 0.67 | 170 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **128** | niskie | | wysokie | 0.69 | 170 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.69 | 170 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **119** | niskie | | wysokie | 0.86 | 170 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 170 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.90 | 170 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 170 | 36 |
| charakter mleczny | MACE | **121** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 170 | 36 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.68 | 170 | 36 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.37 | 157 | 35 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |