# BIERMANN HOLSTEINS CALGARY

NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000541236984**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0541236984**<br>NUMER | **2021-09-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **985** | 0.78 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **445** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1314** | 0.77 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1156** | 0.75 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1231** | 0.79 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.73 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2868** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **540** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **61.5** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **33.3** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **24.9** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **122** | 0.67 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **114** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **126** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **142** | 0.77 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AA | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA |
| LGBS | MFF | POF | POF | SCDF | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **108** | mały | | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **107** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | G | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | - | - |
| wymię | G | **137** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | - | - |
| budowa ogólna | G | **124** | niepożądana | | pożądana | 0.77 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **113** | niski | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **85** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **106** | wąska | | szeroka | 0.81 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | G | **114** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GMACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | - | - |
| racice | G | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **114** | iksowate | | równolegle | 0.75 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **133** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **128** | niskie | | wysokie | 0.80 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **107** | słabe | | mocne | 0.79 | - | - |
| położenie wymienia | G | **132** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **117** | wąskie | | szerokie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **98** | szerokie | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | G | **100** | krótkie | | długie | 0.83 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | G | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.81 | - | - |
| kondycja | G | **108** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | G | **120** | słaba | | dobra | 0.75 | - | - |
| struktura kostna | G | **107** | gruba | | płaska | 0.76 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **96** | | | | 0.65 | - | - |
| temperament | G | **113** | | | | 0.54 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **91** | | | | 0.69 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **116** | | | | 0.71 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **84** | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 129 | | > | | 0.75 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 112 | | | | 0.51 | - | - |