| WIL | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000542760395**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0542760395**<br>NUMER | **2023-11-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1035** | 0.78 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **824** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1189** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **993** | 0.75 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1213** | 0.78 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1095** | 0.72 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3887** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1320** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **121.7** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.66** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **56.3** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **59.1** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **-0.04** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **122** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **128** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.76 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDC | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **124** | mały | > | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **120** | niepożądany | > | pożądany | 0.73 | - | - |
| nogi-racice | G | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | - | - |
| wymię | G | **124** | niepożądane | > | pożądane | 0.75 | - | - |
| budowa ogólna | G | **126** | niepożądana | > | pożądana | 0.76 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **117** | niski | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **104** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **107** | wąska | | szeroka | 0.80 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | G | **109** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | G | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **122** | iksowate | > | równolegle | 0.74 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **119** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **134** | niskie | > | wysokie | 0.79 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **93** | słabe | | mocne | 0.78 | - | - |
| położenie wymienia | G | **115** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **146** | wąskie | > | szerokie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **103** | szerokie | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | G | **101** | krótkie | | długie | 0.83 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | G | **121** | ordynarny | > | szlachetny | 0.81 | - | - |
| kondycja | G | **85** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | G | **122** | słaba | > | dobra | 0.74 | - | - |
| struktura kostna | G | **122** | gruba | > | płaska | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **105** | | | | 0.65 | - | - |
| temperament | G | **104** | | | | 0.55 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **103** | | | | 0.67 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **111** | | | | 0.70 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **87** | | | | 0.65 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 110 | | | | 0.74 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 101 | | | | 0.53 | - | - |