
# BEY REBEL
NAZWA

| DEUM000543171185 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0543171185** | **2024-09-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **988** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **501** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1296** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1079** | 0.73 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1268** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1078** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2945** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **823** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **75.1** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **33.5** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **20.4** | 0.76 |
| % LAKTOZY | **-0.19** | 0.76 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.59 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.79 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **125** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **138** | 0.72 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | BB | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **124** | mały | | duży | 0.66 | - | - |
| siła mleczności | G | **122** | niepożądany | | pożądany | 0.68 | - | - |
| nogi-racice | G | **143** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | - | - |
| wymię | G | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | - | - |
| budowa ogólna | G | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.72 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **130** | niski | | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **103** | płytki | | głęboki | 0.76 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **105** | wąska | | szeroka | 0.77 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | G | **119** | wąski | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GMACE | **79** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | - | - |
| racice | G | **126** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **139** | iksowate | | równolegle | 0.70 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **127** | luźne | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **124** | niskie | | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **106** | słabe | | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | G | **131** | niskie | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **119** | wąskie | | szerokie | 0.70 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **98** | szerokie | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | G | **112** | krótkie | | długie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | G | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.78 | - | - |
| kondycja | G | **98** | słaba | | mocna | 0.79 | - | - |
| lokomocja | G | **142** | słaba | | dobra | 0.70 | - | - |
| struktura kostna | G | **103** | gruba | | płaska | 0.71 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **86** | | | | 0.59 | - | - |
| temperament | G | **107** | | | | 0.48 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **114** | | | | 0.63 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **106** | | | | 0.65 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **103** | | | | 0.61 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **98** | | | | 0.70 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **117** | | | | 0.43 | - | - |