| OHIOS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000576726293**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0576726293**<br>NUMER | **1996-01-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **560** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-402** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **991** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1045** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **857** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **951** | 0.32 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1913** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1268** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-37.4** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-42** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **119** | 0.41 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **114** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 33 | 30 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 33 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 33 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.71 | 33 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.59 | 33 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.58 | 33 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 33 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.63 | 33 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.58 | 33 | 30 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 33 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.62 | 33 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.50 | 33 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.55 | 33 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.68 | 33 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 33 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.70 | 33 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 33 | 30 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.07 | 30 | 27 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.40 | 31 | 30 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |