
| RUKIRO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000577714708**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0577714708**<br>NUMER | **1997-02-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **593** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-195** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **970** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **972** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **836** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **893** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1205** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-816** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.9** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 41 | 40 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 41 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **66** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 41 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.74 | 41 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.64 | 41 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.62 | 41 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 41 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **65** | wąski | | szeroki | 0.67 | 41 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 41 | 40 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 41 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.66 | 41 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.56 | 41 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **68** | słabe | | mocne | 0.60 | 41 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.71 | 41 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **50** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 41 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.73 | 41 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **52** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 41 | 40 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.32 | 11 | 10 |
| temperament | MACE | **77** | | | | 0.23 | 35 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.48 | 49 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 79 | < | | | 0.49 | 49 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |