
# LAFLOER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000577927224**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0577927224**<br>NUMER | **1998-06-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **580** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-272** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **900** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **986** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **910** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1547** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-598** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 43 | 33 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 43 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 43 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **78** | niski | | wysoki | 0.76 | 43 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.65 | 43 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.63 | 43 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 43 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.68 | 43 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 43 | 33 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 43 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.67 | 43 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.56 | 43 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.61 | 43 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.73 | 43 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 43 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.75 | 43 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 43 | 33 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.13 | 40 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.33 | 184 | 102 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.50 | 66 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.32 | 184 | 102 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.50 | 66 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |