
| RENO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000661274075**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0661274075**<br>NUMER | **1999-09-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-274** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **974** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1036** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **983** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1150** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-722** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.2** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-27.6** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-32.8** | 0.35 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.35 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **117** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | - | - |
| wymię | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **89** | niski | | wysoki | 0.78 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **87** | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **85** | wąska | | szeroka | 0.68 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | - | - |
| szerokość zadu | I | **87** | wąski | | szeroki | 0.70 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **97** | iksowate | | równolegle | 0.53 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **88** | luźne | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **90** | niskie | | wysokie | 0.59 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **93** | słabe | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **95** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **85** | szerokie | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | I | **95** | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **96** | słaba | | mocna | 0.74 | - | - |
| lokomocja | I | **104** | słaba | | dobra | 0.51 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.32 | 35 | 31 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.19 | 28 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **92** | | | | 0.37 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **99** | | | | 0.50 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 98 | | | | 0.49 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |