
| CAIRO |
|---|
| NAZWA |

| | |
|---|---|
| **DEUM000768305210**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0768305210**<br>NUMER | **2002-11-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **623** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-143** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **889** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **991** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1091** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1429** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-600** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.4** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 70 | 40 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 70 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 70 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **118** | niski | | wysoki | 0.83 | 70 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.72 | 70 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.69 | 70 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 70 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.76 | 70 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 70 | 40 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 70 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 70 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.75 | 70 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.63 | 70 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.71 | 70 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.80 | 70 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 70 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.83 | 70 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 70 | 40 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.72 | 70 | 40 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.43 | 69 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.32 | 49 | 29 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.39 | 309 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.57 | 107 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.36 | 309 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.58 | 107 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |