
| LEVIS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000810988190**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0810988190**<br>NUMER | **1998-08-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-44** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1061** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **992** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.78 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **177** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-107** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.2** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.4** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-5** | 0.41 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.41 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.75 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **112** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| wymię | I | **92** | niepożądane | | | | pożądane | 0.69 | - | - |
| budowa ogólna | I | **94** | niepożądana | | | | pożądana | 0.66 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **90** | niski | | | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **93** | płytki | | | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **94** | wąska | | | | szeroka | 0.84 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **111** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | | | szeroki | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.90 | - | - |
| racice | I | **95** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **97** | iksowate | | | | równolegle | 0.70 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **92** | luźne | | | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **90** | niskie | | | | wysokie | 0.75 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **88** | słabe | | | | mocne | 0.89 | - | - |
| położenie wymienia | I | **100** | niskie | | | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **107** | szerokie | | | | wąskie | 0.94 | - | - |
| długość strzyków | I | **88** | krótkie | | | | długie | 0.96 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **104** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.94 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **108** | słaba | | | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | I | **106** | słaba | | | | dobra | 0.64 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | | | 0.41 | 1467 | 666 |
| temperament | F | **94** | | | | | | 0.28 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **92** | | | | | | 0.54 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **118** | | | | | | 0.75 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **95** | | | | | | 0.57 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 113 | | | | 0.74 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |