
| NAZWA | |
|---|---|
| **DEUM000813988253**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0813988253**<br>NUMER | **2008-08-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **708** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-207** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1086** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1091** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1167** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1051** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **289** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **23** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.7** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **132** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 112 | 80 |
| wymię | MACE | **122** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 112 | 80 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 112 | 80 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.83 | 112 | 80 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.67 | 112 | 80 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.68 | 112 | 80 |
| ustawienie zadu | MACE | **82** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 112 | 80 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | szeroki | 0.77 | 112 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 112 | 80 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 112 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 112 | 80 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **120** | luźne | | mocne | 0.71 | 112 | 80 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.71 | 112 | 80 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.60 | 112 | 80 |
| położenie wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.83 | 112 | 80 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 112 | 80 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.79 | 112 | 80 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 112 | 80 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 112 | 80 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.73 | 102 | 75 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.44 | 103 | 73 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.34 | 91 | 64 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.15 | 91 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.32 | 242 | 125 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.33 | 180 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.35 | 329 | 157 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.45 | 280 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |