| TAIFUN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001269135916**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609443445**<br>NUMER | **1994-07-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **563** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-423** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **925** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1032** | 0.82 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **972** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1068** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2221** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1166** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-45** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-40.6** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-54.9** | 0.86 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.86 |
| LICZBA CÓREK | **17** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **16** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.80 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **85** | mały | | duży | 0.69 | 1 | 1 |
| siła mleczności | GF | **87** | niepożądany | | pożądany | 0.72 | 1 | 1 |
| nogi-racice | GFI | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | 1 | 1 |
| wymię | GFI | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.83 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | GFI | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **93** | niski | | wysoki | 0.93 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | GFI | **97** | płytki | | głęboki | 0.89 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **103** | wąska | | szeroka | 0.89 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | GFI | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.91 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | GFI | **101** | wąski | | szeroki | 0.90 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.91 | 1 | 1 |
| racice | GF | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **104** | iksowate | | równolegle | 0.82 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **102** | luźne | | mocne | 0.90 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **78** | niskie | | wysokie | 0.86 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **86** | słabe | | mocne | 0.90 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | GFI | **96** | niskie | | wysokie | 0.92 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | GF | **77** | wąskie | | szerokie | 0.78 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | GFI | **81** | szerokie | | wąskie | 0.94 | 1 | 1 |
| długość strzyków | GFI | **111** | krótkie | | długie | 0.96 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | - | - |
| charakter mleczny | GF | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | 1 | 1 |
| kondycja | GI | **114** | słaba | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | GI | **99** | słaba | | dobra | 0.80 | - | - |
| struktura kostna | G | **93** | gruba | | płaska | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **122** | | | > | 0.65 | - | - |
| temperament | G | **113** | | | | 0.57 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **89** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **116** | | | | 0.84 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **82** | | | | 0.73 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **114** | | | | 0.84 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **99** | | | | 0.43 | - | - |