
# ESPARTO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM001400298520**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1400298520**<br>NUMER | **1996-03-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-195** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **975** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1043** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1502** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1020** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.7** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 45 | 37 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 45 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 45 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.73 | 45 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.62 | 45 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.62 | 45 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 45 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.66 | 45 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 45 | 37 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 45 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.65 | 45 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.55 | 45 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.59 | 45 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.70 | 45 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.66 | 45 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.71 | 45 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 45 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.36 | 27 | 24 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.26 | 20 | 20 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.48 | 46 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.49 | 46 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |