
| HONDUR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001401106834**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1401106834**<br>NUMER | **1999-02-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-182** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **967** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **950** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **940** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1206** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-814** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **110** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 86 | 29 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 86 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 86 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.84 | 86 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.75 | 86 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.72 | 86 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 86 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.77 | 86 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 86 | 29 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **79** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 86 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.77 | 86 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.65 | 86 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.74 | 86 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.82 | 86 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 86 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.85 | 86 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 86 | 29 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.40 | 294 | 44 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.57 | 107 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.38 | 294 | 44 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.58 | 107 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |