
| COLE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000253370**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK253370**<br>NUMER | **2009-01-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **803** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **131** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1148** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1109** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1000** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1282** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **759** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.1** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.1** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **124** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **102** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | - | - |
| budowa ogólna | I | **93** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **107** | niski | | | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **79** | płytki | < | | | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **80** | wąska | | | | szeroka | 0.75 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **110** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **86** | wąski | | | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **118** | pionowa | | | | podsiebna | 0.81 | - | - |
| racice | I | **94** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **108** | iksowate | | | | równolegle | 0.63 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **99** | luźne | | | | mocne | 0.76 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **90** | niskie | | | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **95** | słabe | | | | mocne | 0.68 | - | - |
| położenie wymienia | I | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **98** | szerokie | | | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | I | **121** | krótkie | | | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **92** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **95** | słaba | | | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.37 | 154 | 112 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.16 | 65 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **97** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **106** | | | | 0.63 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **110** | | | | 0.52 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 110 | | | | 0.64 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |