
# VH ROENHAVE MISSOURI MASSEY
NAZWA

| DNKM000000258442 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DK258442** | **2015-08-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **864** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **203** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1220** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1161** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1057** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2172** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1000** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.5** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **22.2** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **35.1** | 0.76 |
| % LAKTOZY | **-0.13** | 0.76 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.70 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **121** | 0.75 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **114** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **126** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **103** | mały | | | | duży | 0.68 | - | - |
| siła mleczności | G | **97** | niepożądany | | | | pożądany | 0.70 | - | - |
| nogi-racice | GI | **99** | niepożądane | | | | pożądane | 0.74 | - | - |
| wymię | GI | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.77 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **94** | niepożądana | | | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **97** | niski | | | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **68** | płytki | < | | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **85** | wąska | | | | szeroka | 0.84 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **89** | wąski | | | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **105** | pionowa | | | | podsiebna | 0.85 | - | - |
| racice | GI | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **85** | iksowate | | | | równolegle | 0.78 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **110** | luźne | | | | mocne | 0.85 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **107** | niskie | | | | wysokie | 0.83 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **88** | słabe | | | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **115** | niskie | | | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **99** | wąskie | | | | szerokie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **91** | szerokie | | | | wąskie | 0.91 | - | - |
| długość strzyków | GI | **98** | krótkie | | | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **91** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.89 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **87** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.85 | - | - |
| kondycja | G | **109** | słaba | | | | mocna | 0.81 | - | - |
| lokomocja | GI | **98** | słaba | | | | dobra | 0.76 | - | - |
| struktura kostna | G | **108** | słaba | | | | dobra | 0.74 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **104** | | | | 0.61 | - | - |
| temperament | G | **100** | | | | 0.52 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **116** | | | | 0.71 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **110** | | | | 0.77 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **122** | | | > | 0.72 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | 111 | | | | 0.79 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 113 | | | | 0.49 | - | - |